

**ESQUEMA DE VACUNACIÓN RECOMENDADO PARA NIÑOS DE 0 – 6 AÑOS. ESTADOS UNIDOS. 2010**

Vacuna ▼ Edad ▶	Nacimiento	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	19-23 meses	2-3 años	4-6 años
Hepatitis B	HepB	HepB			HepB						
Rotavirus			RV	RV	RV <sup>2</sup>						
Difteria, tosferina, tétanos			DTaP	DTaP	DTaP		DTaP				DTaP
Haemophilus influenzae tipo B			HiB	HiB	HiB	HiB					
Neumococo			PCV	PCV	PCV	PCV				PPSV	
Poliovirus Inactivada			IPV	IPV	IPV						IPV
Influenza						Influenza (anualmente)					
Sarampión, Rubeola, Paperas						MMR					MMR
Varicela						Varicela					Varicela
Hepatitis A						HepA (2 dosis)				HepA serie	
Meningococo											MCV

Rango de edad recomendado para todos los niños excepto para ciertos grupos de alto riesgo  
 Rango de edad recomendado para ciertos grupos de alto riesgo

**1.- Hepatitis B. HepB.** (Edad mínima al nacimiento)

**Al nacimiento:**

- Adminístrese a todos los recién nacidos al egreso hospitalario
- Si la madre es HBsAg positivo o desconocido adminístrese en las primeras 12 horas de nacido

**Después del nacimiento:**

- La segunda dosis se administra a la edad de 1 a 2 meses
- La dosis final no se debe administrar antes de las 24 semanas (6 meses)

**2.- Rotavirus. RV.** (Edad mínima 6 semanas)

- Administre la primer dosis entre las 6 y 14 semanas (edad máxima 14 semanas)
- La edad máxima para dosis final de la serie es 8 meses
- Si es Rotarix solo se administran 2 dosis

**3.- Toxide diftérico y tetánico y Pertussis acelular. DTaP.** (Edad mínima 6 semanas)

- La cuarta dosis puede ser aplicada desde los 12 meses, administrada al menos 6 meses después de la tercera dosis
- La dosis final de la serie se aplica entre los 4 y 6 años

**4.- Vacuna conjugada Haemophilus influenzae tipo b. Hib.** (Edad mínima 6 semanas)

- PedvaxHIB o Comvax (HepB+Hib) se aplica a los 2 y 4 meses, la dosis a los 6 meses no está indicada
- TriHiBit (DTaP) y Hiberix no deben ser usadas para dosis de 2, 4 y 6 meses, pero pueden ser usadas como dosis final en niños de 12 meses a 4 años

**5.- Vacuna Neumococo.** (Edad mínima 6 semanas para Neumococo conjugada [PCV]; 2 años para Neumococo polisacárido [PPSV])

- PCV es recomendada en niños menores de 5 años. Administre 1 dosis de PCV en niños sanos con edad de 24 a 59 meses quienes no están completamente vacunados para la edad
- Administre PPSV 2 o mas meses después de la ultima dosis de PCV a niños de 2 años o mayores con alguna condición medica especial

**6.- Poliovirus inactivada (IPV).** (Edad mínima 6 semanas)

- La dosis final de la serie debe ser administrada después de los 4 años de edad y al menos 6 meses después de la dosis previa
- Si las 4 dosis son administradas antes de los 4 años una quinta dosis debe ser administrada entre los 4 y 6 años

**7.- Influenza (Estacional)** (Edad mínima 6 meses para la vacuna influenza inactivada trivalente [TIV]; 2 años para la vacuna influenza viva atenuada [LAIV])

- Adminístrese anualmente a niños de 6 meses a 18 años
- No se administre LAIV a niños de 2 a 4 años con sibilancias en los últimos 12 meses
- La dosis de TIV para niños de 6 a 35 meses es 0.25 ml o 0.5 ml para niños mayores de 3 años
- Administre 2 dosis separadas con 4 semanas a niños menores de 9 años si es la primera vez que se vacunan

**8.- Sarampión, Rubeola, Paperas. MMR.** (Edad mínima 12 meses)

- Administre la segunda dosis entre los 4 y 6 años. La segunda dosis puede ser administrada antes de los 4 años aplicada al menos 28 días posterior a la primer dosis.

**9.- Varicela** (Edad mínima 12 meses)

- Administre la segunda dosis entre los 4 y 6 años. La segunda dosis puede ser administrada antes de los 4 años aplicada al menos 3 meses posterior a la primer dosis
- Pa niños de 12 meses a 12 años el intervalo mínimo entre dosis es de 3 meses, si la segunda dosis fue aplicada al menos 28 días después de la primera puede ser aceptada como valida

**10.- Hepatitis A. HepA.** (Edad mínima 12 meses)

- Adminístrese a todos los niños de 1 año (12 a 23 meses)
- 11.- Meningococo. MCV. (Edad mínima 2 años para Meningococo conjugada [MCV4] y para meningococo polisacárido [MPSV4])
- Administre MCV4 a niños de 2 a 10 años con deficiencia del complemento, Asplenia funcional o anatómica y otras condiciones de riesgo
- Administre MCV4 a niños previamente vacunados con MCV4 o MPSV4 despues de 3 años de la primer dosis administrada a la edad de 2 a 6 años



Elaborado por Dr. Víctor Hugo Espinoza Román. Infectólogo Pediatra.  
[www.infectologiapediatrica.com](http://www.infectologiapediatrica.com)      [infectopediatra@hotmail.com](mailto:infectopediatra@hotmail.com)

Esquema de vacunación recomendado por: [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](http://www.cdc.gov), American Academy of Pediatrics (<http://www.aap.org>), and the American Academy of Family Physicians (<http://www.aafp.org>)

Version original en PDF: [http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/downloads/child/2010/10\\_0-6yrs-schedule-pr.pdf](http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/downloads/child/2010/10_0-6yrs-schedule-pr.pdf)